

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам  
протокол от 12 сентября 2019 г. № 103

## **Инструкция по применению ветеринарного препарата «Тимпанол М»**

### **1 Общие сведения**

1.1 Тимпанол М (Tympanolum M).

1.2 Препарат представляет собой жидкость от коричневого до черного цвета. Допускается выпадение незначительного осадка.

1.3 Препарат содержит 5% молочной кислоты, 1 % муравьиной кислоты, вспомогательные вещества (натрия бензоат, пеногаситель) и растворитель (вода очищенная).

1.4 Препарат упаковывают в полимерную упаковку номинальным объемом 20, 50, 100, 200, 250, 400, 450, 500 см<sup>3</sup> и 1 дм<sup>3</sup>.

1.5 Препарат хранят в упаковке предприятия-производителя, по списку Б, в сухом, защищенном от света месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

1.6 Срок годности – два года от даты производства при соблюдении условий хранения.

### **2 Фармакологические свойства**

2.1 Препарат оказывает руминаторное, противобродильное и антисептическое действие.

Препарат при введении внутрь жвачным животным, препятствует газообразованию, разрушает образовавшиеся в кормовых массах пузырьки газа и обеспечивает быстрое удаление их во внешнюю среду.

2.2 Входящие в состав препарата органические кислоты, молочная и муравьиная, подавляют рост и развитие патогенной, гнилостной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, чем обусловлено снижение образования токсичных продуктов распада органических веществ в организме.

Компоненты препарата возбуждают деятельность пищеварительных желез, усиливают секрецию и перистальтику пищеварительного тракта, расслабляют тонус сфинктеров преджелудков, что обеспечивает быстрое продвижение содержимого в кишечнике.

2.3 После всасывания из желудочно-кишечного тракта компоненты препарата используются организмом для синтеза глюкозы и гликогена.

### **3 Порядок применения**

3.1 Препарат предназначен для лечения крупного рогатого скота, овец и коз при гипо- и атонии рубца, острой и периодической тимпании.

3.2 Препарат задают внутрь при помощи резиновой бутылки или пищеводного зонда непосредственно в полость рубца, в следующих дозах:

- крупному рогатому скоту – 100-120 см<sup>3</sup> на 100 кг массы тела животного, телятам – 50-60 см<sup>3</sup> на животное с водой в соотношении 1:1-1:2;

- мелкому рогатому скоту (овцам, козам) – 50-60 см<sup>3</sup> на животное с водой в соотношении 1:1-1:2.

В случае необходимости (острое течение тимпании, нарушение акта глотания) препарат можно вводить в полость рубца с помощью троакара через брюшную стенку в области левой голодной ямки. Если состояние животного через 20-30 мин после введения препарата не улучшилось, препарат применяют повторно.

3.3 При применении препарата допускается использовать другие лекарственные средства (настойку чемерицы, ихтиол).

3.4 В рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных явлений.

3.5 Продукцию, полученную от животных, обработанных препаратом, используют без ограничений.

### **4 Меры профилактики**

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности.

## 5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия нормативным документам.

## 6 Полное наименование производителя

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «Белэкотехника», пер. Промышленный, 9, 222823, г.п. Свислочь, Пуховичский район, Минская область, Республика Беларусь.

Инструкция по применению препарата разработана доцентом кафедры фармакологии и токсикологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» Петровым В.В., заместителем директора по качеству и развитию ООО «Белэкотехника» Пиотухом А.С.

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
ОДОБРЕНО	
Председатель	
Секретарь	
Эксперт	
12.09.2019	протокол № 103