СОГЛАСОВАНО
«Белорусский государственный ветеринарный центр»
(Приказ Департамента ветеринарного и продовольственного надзора)
№ 105 от 30.12.2025

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата «Тилфлотрим»

1 Общие сведения

1.1 Тилфлотрим (Tilflotrimum).

Международное непатентованное наименование активных фармацевтических субстанций: тилмикозин, левофлоксацин, триметоприм (tilmicosin, levofloxacin, trimethoprim).

1.2 Лекарственная форма: раствор для приема внутрь.

1.3 В 1 мл препарата в качестве действующих веществ содержится 50 мг тилмикозина, 25 мг левофлоксацина, 25 мг триметоприма, вспомогательные вещества (натрия гидроксиметансульфинат, динатрия эдетат, уксусная кислота ледяная, вода очищенная).

1.4 По внешнему виду препарат представляет собой раствор от светло-желтого до темно-желтого цвета. Допускается выпадение незначительного осадка.

1.5 Препарат выпускают в полимерных флаконах по 1 л, которые укупоривают полимерной крышкой.

1.6 Препарат хранят и транспортируют в упаковке производителя, в защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

1.7 Срок годности препарата – два года от даты производства при соблюдении условий хранения и транспортирования, после первого вскрытия упаковки – 28 суток при указанных условиях хранения. Не применять по истечении срока годности. Препарат уничтожают в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.8 Отпускается в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется обращение ветеринарного лекарственного препарата.

2 Фармакологические свойства

2.1 Препарат относится к антибактериальным средствам группы антибиотики макролиды в комбинациях.

2.2 Комбинация действующих веществ высокоактивна в отношении грамотрицательных (*Campylobacter spp.*, *Enterobacter spp.*, *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*, *Pseudomonas spp.*, *Salmonella spp.*, *Serratia spp.*, *Rickettsia spp.*, *Bordetella spp.*, *Ornithobacterium rhinotracheale*) и грамположительных (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Enterococcus spp.*, *Mycobacterium spp.*, *Clostridium spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Corynebacterium spp.*) микроорганизмов, а также в отношении *Chlamydia spp.*, *Brachyspira hyodysenteriae* и *Mycoplasma spp.*

Активнодействующие вещества препарата проявляют синергизм действия, тем самым расширяя спектр антимикробной активности.

2.3 Тилмикозин – антибиотик группы макролидов. Механизм бактериостатического действия заключается в блокировании белкового синтеза в микробной клетке на рибосомальном уровне.

Левофлоксацин – антибактериальное средство группы фторхинолонов широкого спектра действия, оказывающее бактерицидное действие. Механизм действия связан с блокадой ДНК-гиразы и топоизомеразы IV, нарушением суперспирализации и сшивки разрывов дезоксирибонуклеиновой кислоты, ингибированием синтеза дезоксирибонуклеиновой кислоты, глубокими метаболическими изменениями в цитоплазме, клеточной стенке и мембранах микробных клеток.

Триметоприм – химиотерапевтическое средство широкого спектра действия из группы диаминопиримидинов. Механизм действия заключается в ингибировании фермента дигидрофолатредуктазы бактерий.

2.4 Все компоненты препарата обладают высокой биодоступностью, после перорального применения быстро всасываются из желудочно-кишечного тракта и проникают в большинство органов и тканей. Максимальная концентрация в сыворотке крови достигается через 1–2 часа, терапевтическая концентрация сохраняется на протяжении 24–48 часов. Действующие вещества препарата выводятся из организма с мочой и желчью.

2.5 Препарат по степени воздействия на организм относится к веществам умеренно опасным (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

3 Порядок применения

3.1 Препарат применяют сельскохозяйственной птице (цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур, индейкам) при эшерихиозе (колибактериозе), пастереллезе, сальмонеллезе, стафилококкозе, стрептококкозе, клостридиозе, орнитобактериозе, микоплазмозе; свиньям при эшерихиозе (колибактериозе), пастереллезе, сальмонеллезе, стафилококкозе, стрептококкозе, гемофилезном полисерозите, микоплазмозе, хламидиозе и других патологиях дыхательной, пищеварительной и мочеполовой систем бактериальной этиологии, вызванных возбудителями, чувствительными к компонентам препарата.

3.2 Препарат задают перорально с питьевой водой в следующих дозах:

- свиньям – 0,25–0,5 мл на 1 кг массы тела животного в течение 3–5 дней. При групповом способе применения – 1–2 л препарата на 1 т питьевой воды в течение 3–5 дней;
- сельскохозяйственной птице (цыплятам-бройлерам, ремонтному молодняку кур, индейкам) – 0,25–0,5 мл на 1 кг массы тела птицы в течение 3 дней. Групповым способом – 1–2 л препарата на 1 т питьевой воды в течение 3 дней.

В период применения препарата приготовленный раствор должен быть единственным источником питьевой воды для животных и птицы. Приготовленный раствор годен в течение 24 часов. При приготовлении маточного раствора препарат добавляют в воду.

3.3 Противопоказанием к применению препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животных и птицы к компонентам препарата. Запрещается применять препарат животным и птице с нарушениями функций почек и печени.

Препарат запрещен к применению птице, чье яйцо используется в пищу людям.

3.4 Особенностей действия при первом применении препарата и при его отмене не выявлено.

3.5 Симптомы передозировки у животных и птицы не выявлены.

3.6 Запрещается применять препарат животным в период беременности, а также курам-несушкам.

3.7 Следует избегать пропуска очередного применения препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске одной дозы препарата курс применения необходимо возобновить в соответствии с назначенными дозой и схемой лечения. Не следует компенсировать пропущенное применение препарата увеличением дозы.

3.8 Побочных явлений и осложнений у животных и птицы при применении препарата в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У животных и птицы с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата возможно проявление аллергических реакций. В этом случае применение препарата прекращают, при необходимости назначают антигистаминные средства, проводят симптоматическое лечение.

3.9 Не допускается совместное применение препарата с бактериостатическими антибиотиками (амфениколами, аминогликозидами, пенициллинами и тетрациклинами), ионофорными эймериостатиками, теофиллином, нестероидными противовоспалительными средствами, препаратами магния и кальция.

3.10 Убой свиней на мясо разрешается не ранее чем через 14 суток, птицы – 12 суток после последнего применения препарата. Мясо животных и птицы, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления плотоядных животных.

4 Меры профилактики

4.1 При работе с препаратом следует соблюдать меры личной гигиены и правила техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами.

4.2 Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае проявления аллергической реакции или при случайном

попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

4.3 При работе с препаратом запрещается пить, курить, принимать пищу. По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки с мылом. При случайном контакте препарата с кожей или слизистыми оболочками, их необходимо промыть большим количеством воды.

4.4 Пустую упаковку из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

5 Порядок предъявления рекламаций

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата его использование прекращают и потребитель обращается в государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил применения этого препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного и птицы ветеринарными специалистами отбираются образцы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора и образцы направляются в государственное учреждение «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР» (Республика Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения соответствия препарата нормативной документации.

6 Полное наименование производителя

6.1 Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЭКОТЕХНИКА», пер. Промышленный, 9, 222823, г.п. Свислочь, Пуховичский район, Минская область, Республика Беларусь.

Адрес производственной площадки: пер. Промышленный, 9/3, г.п. Свислочь.

Инструкция по применению препарата разработана сотрудниками УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» (В.В. Петровым, Д.В. Готовским, Е.В. Романовой, А.А. Белко) и ООО «БЕЛЭКОТЕХНИКА» (Т.А. Никитиной).